

¡Prepárese para su tomografía PET/CAT!

Tenga en cuenta que: Si no podemos comunicarnos con usted, usted **DEBE LLAMAR EN UN PLAZO DE 48 HORAS PARA REVISAR LAS INSTRUCCIONES Y CONFIRMAR** su cita al: **856-546-3006, ext. 2250.**

Si no podemos confirmar su asistencia para la cita programada, tendremos que volver a programar su prueba.

1.) DISPONGA DE 1.5 HORAS Y MEDIA PARA LA PRUEBA.

LLEGUE 30 MINUTOS ANTES DE SU CITA PARA REGISTRARSE.

2.) NO INGIERA PRODUCTOS CON CAFEÍNA NI DESCAFEINADOS 24 HORAS ANTES DE LA PRUEBA O SU CITA SE CANCELARÁ

Esto incluye bebidas, alimentos y medicamentos de venta libre que contienen cafeína. Consulte el recuadro a continuación. Sólo puede beber agua, leche o jugo.

NO



Ejemplos de productos con cafeína y descafeinados:	Medicamentos comunes y de venta libre:
Café común o descafeinado: de cualquier tipo, filtrado, instantáneo, helado	Anacin, Excedrin, medicamentos de venta libre para tratar la migraña
Té común, verde o descafeinado: de cualquier tipo, filtrado, instantáneo, helado	Cafergot, Compuesto Darvon, Midol, Vivarin, No-Doz
Chocolate: leche con chocolate, golosinas, pastel, cacao, postre de chocolate, brownies, chocolate negro, para repostería, semiamargo, helado, bebidas proteicas	Esgic Fioricet, Fiorinal
Gaseosas: cola. Coke, Diet Coke, Pepsi, Diet Pepsi, Mountain Dew, Dr. Pepper, Diet Dr. Pepper, Tab, Jolt, Mellow Yellow, Mr. Pibb, Orange, Diet Orange, Cream, Diet Cream, Tahitian Treat, todas las bebidas energizantes	Norgesic, Norgesic Forte Synalogs-DC Wigraine

3.) INFÓRMENOS SI TOMA MEDICAMENTOS PARA LA RESPIRACIÓN QUE CONTIENEN TEOFILINA.

CONSULTE EL RECUADRO A CONTINUACIÓN, AL IGUAL QUE LA(S) ETIQUETA(S). ESTOS MEDICAMENTOS DEBEN SUSPENDERSE 48 HORAS ANTES DE SU CITA. DEBE CONSULTAR CON SU MÉDICO PARA DETERMINAR SI PUEDE DEJAR DE TOMAR ESTOS MEDICAMENTOS.

Teofilinas:		
Aerolate	Quibron-SR	Theocron
Aggrenox	Slo-bid Gyrocaps	Theo-Dur
Bronkodyl	Slo-Phyllin Gyrocaps	Gotas Theo-Dur
Constant-T	Sustaire	Theolair – SR
Elixophyllin SR	Theo-24	Theospan – SR
Persantine (dipiridamol)	Theobid Duracap	Theovent-L.A.
Respid	Theobid Jr. Duracap	Trental
	Theoclear L.A.	Uniphyl



4. Ayune 4 horas antes de la prueba

Puede desayunar/almorzar algo ligero (jugo, agua, leche blanca, pan tostado, cereal) hasta 4 horas antes de su cita. Si es adecuado, beba abundante agua el día anterior a la prueba. Esto es importante si no tiene venas buenas. Puede traer un refrigerio ligero para después de la prueba de esfuerzo. No ingiera nada por vía oral, ni siquiera agua, 4 horas antes de su cita. **Si necesita tomar medicamentos durante este período de 4 horas, puede beber un poco de agua al hacerlo.**



5. Todos los demás medicamentos habituales deben tomarse como de costumbre, a menos que su médico le indique lo contrario

Es importante que utilice los inhaladores o los nebulizadores en los horarios regulares programados antes de realizarse la prueba de esfuerzo. Si tiene recetado un inhalador de rescate, tráigalo con usted, aunque no lo utilice a diario. Si usted es una persona oxígeno dependiente, traiga su oxígeno con usted.



6. Pacientes diabéticos

Bomba de insulina: Sin cambios

Insulinodependiente: Debe administrarse la mitad (1/2) de la dosis habitual por la mañana para los que toman medicamentos orales (por la boca): No debe tomarlos la mañana de la prueba.



7. Use un conjunto de dos piezas, cómodo y abrigado

No use camisas con botones o cierres de metal. Las mujeres no deben usar un sujetador con aros. No utilice collares. No se ponga lociones ni talco en el pecho o los brazos. Traiga una manta para su comodidad.

8. No fume después de la medianoche la noche anterior a la prueba



9. Traiga lo siguiente:

- Una lista de sus medicamentos
- La receta u otra orden escrita de su prueba
- Tarjeta(s) del seguro
- Identificación con fotografía



Información sobre la prueba: Será necesario que usted permanezca acostado/a en la cama del equipo de tomografía durante aproximadamente 30 minutos. Revise la lista de control adjunta para asegurarse de que se encuentra en un estado físico apto para realizar la prueba. Se le insertará una vía intravenosa en el brazo para administrar la infusión de la sustancia radiactiva que se utiliza para tomar imágenes del corazón mientras está en reposo. Después de estas imágenes iniciales, se le hará la prueba de esfuerzo farmacológica en la cama del equipo de tomografía PET. Durante la prueba de esfuerzo, se le aplicará una segunda inyección de la sustancia radiactiva y se tomará inmediatamente un segundo grupo de imágenes. Nos comunicaremos con usted 2-5 días antes de la prueba para consultar sobre sus medicamentos y repasar las instrucciones para la prueba. Nuevamente, algún medicamento PODRÍA interferir con la prueba; en caso de ser necesario, le informaremos si hay algún medicamento que no deba tomar.

Llámenos al 856-546-3006, ext. 2250 si tiene alguna pregunta o inquietud antes de la prueba.